



Toux de chenil



Agent pathogène

- Bactéries : *Bordetella bronchiseptica*, mycoplasmes...
- Virus : virus parainfluenza canin, adénovirus canin de type 2, maladie de Carré, herpèsvirus canin...



Transmission

- Directe principalement : par contact nez-nez



Population sensible

- Tout chien pouvant rencontrer d'autres chiens



Principaux signes cliniques

- Toux sèche et quinteuse, d'apparition soudaine, abattement, anorexie
- En cas de co-infections : possibilité de bronchopneumonie parfois fatale pour les jeunes chiots ou les chiens immunodéprimés



Traitement

Principalement symptomatique, antibiotiques seulement si nécessaire



Pronostic

Fonction de l'agent pathogène : plutôt favorable sauf bronchopneumonie sur chiens fragilisés (jeunes chiots, immunodéprimés)



Prévention

- Vaccination, même sur les chiens ayant déjà présenté des symptômes de CIRDC



Hépatite de Rubarth



Agent pathogène

Virus : adénovirus canin de type 1



Transmission

- Directe : contact oronasal (virus excrété notamment dans les urines)



Population sensible

- Chiens de tout âge (plus fréquent sur les chiens de moins d'un an)



Principaux signes cliniques

Troubles digestifs (diarrhée, vomissement), fièvre inconstante, hémorragies, atteintes oculaires, troubles nerveux



Traitement

Symptomatique



Pronostic

Variable selon la sévérité de l'atteinte, décès possible



Prévention

- Vaccination



Leishmaniose



Agent pathogène

Protozoaire : *Leishmania infantum* (pour le pourtour méditerranéen)



Transmission

- Indirecte principalement : par les phlébotomes
- Directe rare : accouplement ou gestation



Population sensible

- Chien
- Chat
- Humain



Principaux signes cliniques

Variables et multiples : amaigrissement, polyadénomégalie, boiterie, signes cutanés



Traitement

Spécifique, mais non curatif. L'animal reste porteur à vie avec évolution progressive par stades



Pronostic

Évolution progressive de la maladie avec atteinte des organes internes et insuffisance rénale



Prévention

- Limiter le contact avec les phlébotomes (rentre les chiens du crépuscule à l'aube, pose de moustiquaires)
- Traitement antiparasitaire contre les phlébotomes
- Vaccination



Leptospirose



Agent pathogène

Bactérie : *Leptospira interrogans* (Canicola, Icterohaemorrhagiae, Australis, Grippotyphosa...)



Transmission

- Directe : contact avec les urines d'animaux infectés (rongeurs notamment)
- Indirecte : contact avec de l'eau contaminée par les urines d'animaux infectés (rongeurs notamment)



Population sensible

- Chien
- Humain
- Cheval...



Principaux signes cliniques

Variés : troubles digestifs, atteinte hépatique, ictère, insuffisance rénale aiguë, troubles respiratoires, oculaires, nerveux



Traitement

- Antibiotiques
- Symptomatique



Pronostic

Variable en fonction des signes cliniques et de l'état de l'animal



Prévention

- Vaccination
- Éviter le contact avec les eaux contaminées (baignade...)
- Limiter les populations de rongeurs



Maladie de Carré



Agent pathogène

Virus : Morbillivirus



Transmission

- Aérogène principalement (contact direct ou aérosols contaminés)
- Transplacentaire possible



Population sensible

- Chiens de tout âge
- Furet



Principaux signes cliniques

Variés : troubles digestifs, respiratoires, cutanés (hyperkératose), nerveux, avortement, décès



Traitement

Principalement symptomatique



Pronostic

Variable selon la sévérité de l'atteinte, décès possible



Prévention

- Vaccination



Parvovirose canine



Agent pathogène

Virus : parvovirus canin, très résistant dans le milieu extérieur



Transmission

- Directe : contact avec des selles contaminées
- Indirecte : contact avec du matériel souillé (les chaussures par exemple)



Population sensible

- Jeunes chiots
- Adultes non vaccinés



Principaux signes cliniques

Troubles digestifs avec gastro-entérite hémorragique, abattement marqué



Traitement

Traitement symptomatique nécessitant souvent une hospitalisation



Pronostic

Jusqu'à 70 % de mortalité chez les très jeunes chiots particulièrement sensibles



Prévention

- Mesures sanitaires : nettoyage et désinfection adaptées (virus très contagieux et résistant)
- Vaccination



Piroplasmose



Agent pathogène

Protozoaire : du genre *Babesia*, notamment *Babesia canis*



Transmission

Par les tiques (lors de leur repas sanguin)



Population sensible

- Chien
- Très rare chez le chat



Principaux signes cliniques

Hyperthermie, léthargie, ictère et coloration des urines, anémie...



Traitement

Spécifique



Pronostic

Réservé : l'évolution peut être fatale en l'absence de traitement



Prévention

- Traitement antiparasitaire efficace contre les tiques
- Examiner le chien à chaque retour de balade et retirer les tiques avec un crochet adapté
- Vaccination



Rage



Agent pathogène

Virus : Lyssavirus



Transmission

Directe : par morsure principalement (salive contaminante)



Population sensible

- Chien et chat
- Furet
- Humain...



Principaux signes cliniques

Troubles nerveux : irritabilité, paralysie, convulsions...



Traitement

Aucun



Pronostic

Sombre : décès de l'animal



Prévention

Vaccination (selon la réglementation, obligatoire pour tout voyage à l'étranger)



Typhus



Agent pathogène

Virus : parvovirus félin, très résistant dans le milieu extérieur (plusieurs semaines à plusieurs mois)



Transmission

- Directe : contact avec des selles contaminées
- Indirecte : contact avec du matériel souillé (les chaussures par exemple), la plus fréquente



Population sensible

- Chat de tout âge
- Chatons particulièrement sensibles



Principaux signes cliniques

Diarrhée, avortement, ataxie cérébelleuse (chaton)



Traitement

Traitement symptomatique nécessitant souvent une hospitalisation



Pronostic

Taux de mortalité élevé (jusqu'à 90 % chez le chaton)



Prévention

- Mesures sanitaires : nettoyage et désinfection adaptées (virus très contagieux et résistant)
- Vaccination (y compris les chats vivant en intérieur)



Calicivirose féline



Agent pathogène

Virus : calicivirus félin, un des agents du coryza



Transmission

- Directe principalement
- Indirecte possible (virus résistant 1 mois sur une surface sèche)



Population sensible

Chats de tout âge



Principaux signes cliniques

Ulcères buccaux, stomatite/gingivite chronique, symptômes respiratoires, boiterie



Traitement

Traitement symptomatique



Pronostic

Selon la virulence du variant et l'âge du chat



Prévention

- Mesures sanitaires : nettoyage, désinfection
- Vaccination (y compris les chats vivant en intérieur)



Chlamydiose féline



Agent pathogène

Bactérie : *Chlamydomphila felis*



Transmission

- Directe : par contact
- Indirecte : par l'intermédiaire de sécrétions oculaires ou nasales contaminées



Population sensible

Chats de tout âge



Principaux signes cliniques

Conjonctivite (yeux rouges et enflammés), écoulements oculaires épais et jaunâtres, éternuements fréquents, nez qui coule



Traitement

La chlamydiose féline peut être traitée efficacement avec des antibiotiques, prescrits par un vétérinaire



Pronostic

Variable (selon l'évolution de la maladie et l'âge du chat)



Prévention

- Vaccination
- Entretenir une bonne hygiène de l'environnement et limiter le contact avec des chats d'origine inconnue et potentiellement infectés



Herpèsvirose féline



Agent pathogène

Virus : herpèsvirus félin, un des agents du coryza



Transmission

Directe : contact avec un chat excréteur ou avec des sécrétions infectieuses



Population sensible

Chats de tout âge



Principaux signes cliniques

Rhinite, conjonctivite, hyperthermie, abattement, anorexie, ulcère cornéen



Traitement

Traitement symptomatique



Pronostic

Plutôt bon mais portage latent



Prévention

Vaccination



Leucose féline



Agent pathogène

Virus leucémogène félin (FeLV)



Transmission

- Directe : contact avec sécrétions virulentes (salive, fèces, lait...) des chats contaminés lors du toilettage, partage de gamelle, allaitement ou morsure lors de bagarre (mode de contamination majeur)
- Indirecte possible : transfusion



Population sensible

- Jeunes chatons
- Résistance à l'infection avec l'âge



Principaux signes cliniques

Immunodépression, anémie, augmentation du risque de lymphome



Traitement

Traitement de soutien et suivi régulier



Pronostic

Variable (selon l'évolution de la maladie)



Prévention

Vaccination